

【肩腱板損傷 診察】

問 1. インピンジメントサインで検者の立ち位置はどれか。(第 28 回)

1. 健側前方
2. 健側後方
3. 患側前方
4. 患側後方

問 2. 急性期の肩腱板損傷で陽性となるのはどれか。(第 28 回)

1. ドロップアームテスト
2. スピードテスト
3. ルーステスト
4. モーリーテスト

問 3. 陳旧性の腱板損傷の症状でないのはどれか。(第 29 回)

1. 肩関節の腫脹
2. 大結節の圧痛
3. 外転時の痛み
4. 就寝中の痛み

問 4. 棘上筋損傷の徒手検査法で誤っているのはどれか。(第 30 回)

1. インピンジメントサイン
2. ペインフルアークサイン
3. ドロップアームサイン
4. リフトオフテスト

問 5. 肩関節のインピンジメントを確認する動作はどれか。(第 30 回)

1. 検者は患者の健側前方に位置する。
2. 検者は大結節を押さえる
3. 肩関節を内旋位で挙上する。
4. 挙上は自動運動で行う。

問 6. 肩腱板損傷で最も多いのはどれか。(第 31 回)

1. 棘上筋腱
2. 棘下筋腱
3. 肩甲下筋腱
4. 小円筋腱

問 7. 肩腱板損傷の際に陽性となるのはどれか。(第 32 回)

1. スピードテスト
2. ジャークテスト
3. ディンプルサイン
4. ペインフルアークサイン

問 8. 肩のインピンジメントの所見でないのはどれか。(第 32 回)

1. 雑音聴取
2. 肩峰下疼痛出現
3. 外転位保持不能
4. 結節間溝部疼痛出現

問 9. 肩腱板の完全断裂はどれか。(第 33 回)

1. 腱内断裂
2. 全層断裂
3. 関節面断裂
4. 滑液包面断裂

問 10. 肩腱板損傷の症状で誤っているのはどれか。(オリジナル問題)

1. 圧痛は筋腹部に多くみられる。
2. 外転 60～120° の間で疼痛が生じることが多い。
3. 夜間痛がみられる。
4. 陳旧性では筋萎縮がみられる。

問 11. クレピタスが陽性所見になる徒手検査はどれか。(オリジナル問題)

1. ドロップアームテスト
2. インピンジメント徴候
3. リフトオフテスト
4. スピードテスト